



Chirurgia Orale – Istruzioni per i Genitori



Prima dell'intervento

- Vestire il bambino con **abiti comodi**.
- Dare **solo liquidi chiari** (acqua, camomilla, tè leggero) circa **2 ore prima** dell'intervento.
- **! Non sospendere farmaci abituali** se non indicato dal medico.
- Preparare a casa:
 - **Ghiaccio**
 - **Paracetamolo o Ibuprofene** (se compatibili)
 - **Antibiotico** se prescritto
 - **Sciacquo alla clorexidina** (solo se indicato)
- Evitare bibite gassate e attività fisica intensa prima della visita.



Durante l'intervento

- Viene eseguita **anestesia locale** → nessun dolore.
- Il bambino può percepire **pressioni o rumori**: tutto normale.
- Il team lo accompagna passo passo per farlo sentire sicuro.
- Durata variabile, in ambiente controllato e tranquillo.



Subito dopo

- Un **lieve sanguinamento** è normale nelle prime ore.
- Applicare **ghiaccio** per 10–15 minuti a intervalli.
- Non fare sciacqui nelle prime 12 ore.

-  Non toccare la zona con lingua o dita.

Alimentazione

- Iniziare con **cibi morbidi e tiepidi**: yogurt, puree, creme, pasta morbida.
-  Evitare cibi duri, croccanti, filamentosi o molto caldi.
-  No cannuccia per 24–48 ore.

Nei giorni successivi

-  Gonfiore e fastidio per 2–3 giorni (a volte fino a una settimana).
-  Lieve febbre nelle prime 24–48 ore possibile.
-  Qualche difficoltà a masticare o aprire la bocca è normale.
-  Recupero variabile in base all'intervento e alla sensibilità del bambino.

Igiene

-  **Primo giorno:** non toccare la zona.
-  **Dal giorno successivo:** lavare normalmente, con movimenti delicati.
-  Sciacqui con **clorexidina** solo se prescritti.
-  Controllare che non si accumuli cibo nell'area operata.

Riposo e attività

-  No sport, corsa o giochi movimentati per 48 ore.
-  Preferire attività tranquille (disegni, libri, giochi calmi).
-  Dormire con la **testa leggermente sollevata** la prima notte.



Quando contattare lo studio

- Sanguinamento **abbondante** che non si ferma.
- Dolore **non controllabile** con antidolorifici compatibili.
- Febbre **> 38°C** oltre 48 ore.
- Gonfiore che **aumenta** dopo il 3° giorno.



Per qualsiasi dubbio, siamo sempre disponibili.